

KULLANMA TALİMATI

AVİLAN-L İ.M. Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır.

Etkin madde: Her bir ampul 100 mg B₁ vitamini, 100 mg B₆ vitamini, 1 mg B₁₂ vitamini ve 20 mg lidokain hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Benzil alkol, potasyum heksasiyanoferrat(III), sodyum heksametafosfat, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **AVİLAN-L nedir ve ne için kullanılır?**
2. **AVİLAN-L'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **AVİLAN-L nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **AVİLAN-L'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. AVİLAN-L nedir ve ne için kullanılır ?

AVİLAN-L, içerisinde 5 ampül bulunan karton kutularda sunulan B vitamini kompleksidir.

AVİLAN-L etkin madde olarak 100 mg B₁ vitamini, 100 mg B₆ vitamini, 1 mg B₁₂ vitamini ve 20 mg. lidokain hidroklorür içerir.

Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetlerde,
- şeker hastalığına bağlı olan ve olmayan sinir iltihabı, sinirsel ağrı, zona, titreme, eklem ve eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap, siyatik sinir

boyunca gelişen ağrı, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi ağrılı durumlarda,

- kalp kası hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak.

2. AVİLAN-L’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVİLAN-L’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, AVİLAN-L içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa AVİLAN-L kullanmayınız.

AVİLAN-L’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, Parkinson, tüberküloz ve gut hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları (folik asit) kullanıyorsanız AVİLAN-L’nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

AVİLAN-L’yi yiyecek ve içecek ile kullanılması

Özel bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Bu nedenle gebelikte yalnızca gerekli olduğu durumlarda hekim tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AVİLAN-L emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

AVİLAN-L’nin araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

AVİLAN-L'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her AVİLAN-L ampülü doz başına 40 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu ilaç doz başına 1 mmol sodyum (39 mg)'dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında "potasyum içermez".

Bu ilaç doz başına 1 mmol sodyum (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Parkinson ve tüberküloz hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları kullanıyorsanız AVİLAN-L'nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. AVİLAN-L nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AVİLAN-L kas içine uygulanır. Verilecek miktar, müstahzarın profilaktik ve terapötik amaçla kullanılmasına göre tespit edilir.

Steril bir enjektöre ampul içeriği çekilir ve kas içine uygulanır.

Genellikle başlangıç dozu olarak günde bir defa enjekte edilmesi yeterlidir. Tedavi, bu doz haftada 2-3 defa tekrarlanarak sürdürülür.

İlacı günün yaklaşık olarak aynı zamanında almaya çalışınız. Belirtiler hafifleyince doz azaltılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

AVİLAN-L adale içine zerk edilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuk hastalarda etkililik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı: Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.

Eğer AVİLAN-L'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİLAN-L kullandıysanız

AVİLAN-L'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AVİLAN-L'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AVİLAN-L ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AVİLAN-L tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AVİLAN-L'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AVİLAN-L'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.
- Olasılıkla öksürük veya ateş ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden kötüleşmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AVİLAN-L'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

AVİLAN-L ayrıca süt salgılanmasını azaltır.

AVİLAN-L ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. AVİLAN-L'nin saklanması

AVİLAN-L'ı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİLAN-L'ı kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİLAN-L'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: GMG Grand Medical İlaçları Ltd. Şti.

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok. K:17 D:60

Esenler / İSTANBUL

Telefon : +90 212 438 50 20

Faks : +90 212 438 55 54

Üretim Yeri: Mefar İlaç San. A.Ş.

Ramazanođlu Mah. Ensar Cad. No: 20

Kurtköy/Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.